

USE UNDER THE SUPERVISION OF A DOCTOR  
READY TO USE • DO NOT ADD WATER OR DILUTE

TASTES BEST SERVED COLD

Use pediatric electrolyte oral solution at the first signs of diarrhea or vomiting, rather than juices, soft drinks, sports drinks or water, to help replace lost fluid and minerals.

#### USAGE

- For infants under 1 year of age: Consult your doctor.
- For children 1 year of age and older: Offer pediatric electrolyte oral solution every 1 to 4 hours. To help maintain proper hydration, the child should consume 1-2 liters (33.8 to 67.6 fl oz) per day of pediatric electrolyte oral solution for as long as diarrhea continues.
- If there is vomiting or fever, or if diarrhea continues beyond 24 hours, consult your doctor.

#### INSTRUCTIONS

- **DO NOT USE IF THE PROTECTIVE BAND AROUND CAP OR INNER SEAL IS BROKEN OR MISSING.**
- Remove protective band and twist off cap.
- Lift and throw away protective seal.
- After opening, replace cap, refrigerate and use **within 48 hours**.
- Store unopened bottles in a cool place. Avoid excessive heat.
- Do not reuse bottle.

#### PEDIATRIC ELECTROLYTE ORAL SOLUTION PROVIDES (per liter):


Sodium, 45 mEq; Potassium, 20 mEq; Chloride, 35 mEq; Dextrose, 25 grams; Zinc, 7.8 milligrams; Calories, 100.

**INGREDIENTS:** WATER, DEXTROSE; **LESS THAN 2% OF:** ZINC GLUCONATE, CITRIC ACID, POTASSIUM CITRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE, ARTIFICIAL GRAPE FLAVOR, SUCRALOSE, ACESULFAME POTASSIUM, FD&C RED #40, FD&C BLUE #1.

#### Questions or comments?

Call 1-877-753-3935 Monday-Friday 9AM-5PM EST

\*This product is not manufactured or distributed by Abbott Laboratories, distributor of Pedialyte®.



With Zinc

COMPARE TO  
PEDIALYTE®

Rugby®

ready to use

Oralyte®  
Pediatric Oral  
Electrolyte Solution

ARTIFICIAL  
GRAPE FLAVOR

Restores fluid and electrolytes  
lost during diarrhea and vomiting  
to help prevent dehydration

1 LITER (33.8 fl oz)



NOTE: NO TEXT OR IMAGE  
IN THIS AREA.  
THIS AREA IS  
ALLOCATED  
FOR LOT#  
AND EXP IMPRINT

#### Compare Ingredients & Save/Compare Ingredientes & Ahorre

Ingredients (Ingredientes)	Rugby® Oralyte®	Pedialyte®
Dextrose (Dextrosa)	✓	✓
Zinc	✓	✓
Potassium Citrate (Citrato de Potasio)	✓	✓
Sodium Chloride (Cloruro de Sodio)	✓	✓
Sodium Citrate (Citrato de Sodio)	✓	✓
<b>Provides (per liter)/(Provee por litro)</b>		
Sodium (Sodio)	45 mEq	45 mEq
Potassium (Potasio)	20 mEq	20 mEq
Chloride (Cloruro)	35 mEq	35 mEq
Dextrose (Dextrosa)	25 g	25 g
Zinc	7.8 mg	7.8 mg
Calories (Calorias)	100	100

Distributed by:  
**Rugby Laboratories**  
17177 N Laurel Park Drive, Suite 233  
Livonia, MI 48152  
www.rugbylaboratories.com

R-58  
Rev. 09/16

USE BAJO LA SUPERVISION DE UN MÉDICO  
LISTO PARA USAR • NO AGREGUE AGUA O NO DILUIR

SABE MEJOR CUANDO SE SIRVE FRÍO

Utilice la solución oral de electrolito pediátrico en los primeros signos de diarrea o vómito, en lugar de jugos, refrescos, bebidas deportivas o agua, para ayudar a reemplazar líquidos y minerales perdidos.

#### USO

- Para bebés menores de 1 año de edad: Consulte con su médico.
- Para niños de un año de edad y mayores: Ofrecer la solución oral de electrolito pediátrico cada 1 a 4 horas. Para ayudar a mantener una hidratación adecuada, el niño debe consumir 1-2 litros (33.8 a 67.6 onzas líquidas) por día de la solución oral de electrolito pediátrico durante el tiempo que la diarrea continúa.
- Si hay vómitos o fiebre, o si la diarrea continúa después de 24 horas, consulte con su médico.

#### INSTRUCCIONES

- **NO USE SI LA BANDA PROTECTORA QUE RODEA LA TAPA O SI EL SELLO INTERIOR FALTA O ESTA ROTO.**
- Retire la banda protectora y desenrosque la tapa.
- Levante y tire a la basura el sello protector.
- Una vez abierto, ponga la tapa, refrigere y utilice **dentro de 48 horas**.
- Guarde en un lugar fresco los frascos sin abrir. Evite el calor excesivo.
- No reutilice la botella.

#### LA SOLUCIÓN ORAL DE ELECTROLITO PEDIÁTRICO PROVEE (por litro):

Sodio, 45 mEq; Potasio, 20 mEq; Cloruro, 35 mEq; Dextrosa, 25 gramos; Zinc, 7.8 miligramos; Calorias, 100.

**INGREDIENTES:** AGUA, DEXTROSA; **MENOS DEL 2% DE:** GLUCONATO DE ZINC, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE POTASIO, CLORURO DE SODIO, CITRATO DE SODIO, SABOR ARTIFICIAL A UVA, SUCRALOSA, ACESULFAME DE POTASIO, FD&C ROJO #40, FD&C AZUL #1.

#### Preguntas o Comentarios?

Llámenos al 1-877-753-3935 LUNES-VIERNES 9AM-5PM HORA ESTE

\*Este producto no ha sido fabricado o distribuido por Abbott Laboratories, distribuidor de Pedialyte®.